

Udskriftsdato: mandag den 12. januar 2026

KEN nr 10773 af 20/09/2007 (Gældende)

Klage over operation for brok hvor testikel efterfølgende måtte fjernes

Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Journalnummer: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, j. nr. 0762604

Klage over operation for brok hvor testikel efterfølgende måtte fjernes

Resumé

En 37-årig mand blev opereret for brok i venstre lyske. Efter operationen havde han stærke smerter, og testiklen var hævet og sad højt oppe. Halvanden måned senere blev han igen opereret, fordi sædstrengen sad fast og skulle frigøres, hvorefter testiklen blev sat på plads i pungen. Efterfølgende sad testiklen højt, og pungen var vedvarende øm og hævet. Et halvt år efter operationen blev testiklen fjernet.

Der blev klaget over, at operationen for brok ikke blev udført korrekt, idet testiklen efterfølgende sad høj oppe og senere måtte fjernes.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere operatøren, da han ikke sikrede, at testiklen lå korrekt i pungen.

Nævnet lagde vægt på, at man i forbindelse med en brokoperation bør sikre, at testiklen ikke ligger højt optrukket i pungen som en konsekvens af træk og mobilisation af sædstrengen under den forudgående del af operationen. Hvis ikke man sikrer, at sædstrengen ligger strakt, og testiklen ligger på plads nede i pungen, vil testiklen vedblive at sidde højt i pungen. Den postoperative væskeansamling i sædstrengen og senere bindevæv mellem prolenenettet og sædstrengen vil forhindre, at testiklen kan komme ned på sin normale plads i pungen.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de to læger, der havde udført den efterfølgende operation.

Nævnet lagde herved vægt på, at indgrebet var vanskeligt på grund af bindevæv.